

Gestione delle Urgenze ed Emergenze ostetriche in sala parto: corso teorico-pratico Capitolo 1: emorragia post parto, distocia di spalle

DESTINATARI

OSTETRICA, MEDICO

METODOLOGIA

LEZIONE-ESERCITAZIONE

MATERIALE

COSTI

PARTECIPAZIONE GRATUITA - EVENTO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE AD OPERATORI INTERNI OSPEDALE SACRA FAMIGLIA ERBA

LUOGO

Erba

CALENDARIO

24 Marzo 2022

ORARIO

14,30-18,30

NUMERO DEI PARTECIPANTI

Posti complessivi: 11

Posti prenotati: 0

Posti confermati: 0

FINALITA'

Aggiornamento periodico pratico e sistematico degli operatori sanitari in ambito di emergenze/urgenze in Ostetricia, soprattutto verso eventi a bassa prevalenza:

- acquisire conoscenze aggiornate alla luce delle ultime evidenze in letteratura, riguardo le emorragie post parto e la distocia di spalla;
- migliorare la propria abilità nella gestione delle emorragie post parto e distocia di spalla per saperle fronteggiare in modo consapevole;
- effettuare le simulazioni di scenari di emergenze: "emorragie post parto " distocia di spalla" per formare il team di sala parto (medici, ostetriche, OSS).

CONTENUTI

Le emergenze ed urgenze in sala parto sono eventi rari, che nella maggior parte dei casi si verificano in donne senza fattori di rischio. Sono situazioni impreviste ed improvvise in cui gli operatori si trovano a passare da una situazione di tranquilla fisiologia ad un contesto di pericolo insolito. Sono eventi che hanno un importante impatto emotivo sugli operatori che sono coinvolti e sulla coppia. E' importante riconoscerle e gestirle al meglio al fine di ridurre al minimo morbosità materna e neonatale.

In particolare:

- L'emorragia post parto rappresenta la principale causa di morbidità materna nel mondo e una delle prime tre cause di mortalità materna. Il rischio assoluto di morte per EPP in Italia è di 1:100.000. Si stima che ogni anno 140.000 donne muoiano nel Mondo per emorragia del post parto. Tuttavia con una diagnosi tempestiva, risorse adeguate ed una gestione ottimale l'EPP può diventare la causa più evitabile di mortalità materna.
- La distocia di spalle consiste nel mancato disimpegno delle spalle dopo che si è verificato il disimpegno delle spalle, dopo che una delicata trazione verso il basso non è stata efficace. Si verifica quando la spalla anteriore si impatta sulla sinfisi materna o, meno comunemente quando la spalla posteriore si impatta contro il promontorio sacrale. Ha una prevalenza da di 2-10 casi su 1000 parti. E' un evento che quando si verifica può portare ad esiti avversi sia materni (lacerazioni di 4° grado, epp, rottura d'utero) che neonatali. E' legata ad una mortalità perinatale del 0.3% ed a morbidità perinatale importante (lesioni transitorie del plesso brachiale (3-17%), frattura della clavicola (1.7-9.5%), frattura dell'omero (0.1-4.2%), lesioni permanenti del plesso brachiale (0.5-1.6%), encefalopatia ipossico ischemica (rischio correlato in

NOTE

DOCENTI

DOTT ZANINI ALBERTO ANTONIO

Direttore Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Sacra Famiglia di Erba

TUTOR

Dott.sa MIGLIETTA MARINELLA

Coordinatrice Ostetrica

PUNTEGGIO ECM

RICHIESTO IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI ECM-CPD PER OSTETRICA, MEDICO